



THIOPRON[®]

THIOPRON[®] è un fungicida a base di zolfo in formulazione liquida con specifici coadiuvanti che lo rendono estremamente resistente al dilavamento. Il calibro omogeneo e predefinito delle micelle conferisce al prodotto elevata efficacia e selettività.



COMPOSIZIONE Zolfo puro 57,3% (825 g/L) (esente da selenio)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

INTERVALLO DI SICUREZZA Non previsto

N° DI REGISTRAZIONE 00013 del 16.03.1972



CONFEZIONE L 10 - 600

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE**
H317 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
Vite	Oidio	2 - 4 4 - 8 8 - 12	In caso di bassa pressione della malattia. In situazioni mediamente gravi. In situazioni gravi o per trattamenti "eradicanti".
	Escoriosi	4 - 6	Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.
	Erinosi ed Acariosi	6 - 12	Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.
	Ticchiolatura, Oidio ed eriofidi (pre e post fioritura)	3 - 5 5 - 9	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci. Con alta pressione della malattia.
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Eriofidi e Patina bianca (da frutto noce a pre raccolta)	3 4 - 6	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci. Con alta pressione della malattia o per trattamenti eradicanti.
	Oidio (in post raccolta)	6 - 9	Pre trattamenti estintivi.
	Oidio	3 - 4	
Nespolo Drupacee (Pesco, Nettarino, Albicocco Ciliegio, Susino)	Oidio	3 - 6 6 - 9	Trattamenti preventivi. Trattamenti estintivi post raccolta.
	Bolla	6 - 9	Trattamenti da inizio caduta foglie a bottoni rosa.
	Monilia	5 - 10	Impiegare le dosi più alte ad inizio e fine fioritura.
	Cladosporiosi	3 - 6	Dalla fase di scamicatura frutti 3 - 5 interventi ad intervalli di 7 - 10 giorni.
	Maculatura rossa dell'albicocco	2,5 - 5	Dalla fase di scamicatura in previsione di pioggia.
	Oidio, Eriofidi	8 - 12	
Nocciolo	Oidio	1 - 5	
Mandarlo	Oidio e Septoria	6 - 10	Da formazione inflorescenza a sviluppo frutto.
Agrumi	Oidio	6 - 10	
Olivo	Oidio ed Acari	3 - 6	
Pomodoro, Peperone, Melanzana			

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	NOTE
 Patata	Oidio	3 - 6	
 Ortaggi a stelo, a radice, a foglia	Oidio	3 - 7,5	
 Ortaggi a bulbo, Legumi, Cavoli	Oidio	3 - 7,5	
 Cucurbitacee	Oidio	3 - 5	
 Fragola	Oidio	3 - 7	
 Piccoli Frutti	Oidio	3 - 7	
 Cereali	Oidio	5 - 8	
 Colza, Ravizzone, Brassica Crenata	Oidio	3 - 6	
 Barbabietola da zucchero	Oidio e Cercospora	3 - 5	In caso di bassa pressione del patogeno o in miscela con altri fungicidi.
		5 - 8	In caso di elevata pressione del patogeno.
 Soia	Oidio	5	
 Forestali, Ornamentali e Floreali	Oidio	2,5 - 5	

CALIBRO OMOGENEO E PREDEFINITO DELLE MICELLE	COPERTURA OTTIMIZZATA	AGENTE ADESIVANTE
 Zolfi colloidali < 1µ  Zolfi WG3µ(range2µ-5µ)  THIOPRON® 1,2µ	THIOPRON® ZOLFO WG  VS.	 Assenza di solventi ed oli minerali o vegetali

- Alta adesività e resistenza al dilavamento
- Perfetta selettività
- Attività preventiva, curativa ed eradicante
- Utilizzabile in agricoltura biologica
- Numerosi campi d'impiego autorizzati

